

報道機関 各位

熊本大学

熱応答経路活性化は、生活習慣病に伴う 非アルコール性脂肪性肝疾患の数値を改善

(ポイント)

- 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)^{*1}は、メタボリックシンドロームや2型糖尿病^{*2}などの代謝異常を伴いやすく、生活習慣病の中でも罹患率が高い重要な疾患です。
- 本来あるべきストレス抵抗能力は、慢性高血糖や炎症の持続により低下します。熱ショック応答経路^{*3}は重要な身体恒常性維持能力の1つで、ストレスに対して生体防御として働きます。
- 温熱療法(HS)と適切な電流刺激(MES)の併用は、熱ショック応答経路を活性化し代謝異常疾患のインスリン抵抗性、高血糖、慢性炎症、内臓脂肪過多などを改善します。
- HS+MES 治療は、メタボリックシンドロームにおいて NAFLD 脂肪変性マーカーを改善し、2型糖尿病^{*4}において NAFLD 脂肪変性マーカーと線維化マーカーの数値を改善しました。これらの改善度は、累積暴露時間依存的でした。

(概要説明)

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 近藤龍也講師、熊本大学大学院医学教育部 宮川展和氏、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 荒木栄一教授、同遺伝子機能応用学 甲斐広文教授らの研究グループは、物理的刺激による熱ショック応答経路の活性化が、メタボリックシンドロームと肥満2型糖尿病患者の非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD) の病態を示すバイオマーカーの数値を改善することを見出しました。 NAFLD は2型糖尿病などの生活習慣病に併存しやすい代謝異常で、インスリン抵抗性や小胞体ストレス、慢性炎症などによって発症します。同グループは、過去に基礎および臨床研究で、温熱療法(HS: Heat Shock)と適切な電流刺激(MES: Mild Electrical Stimulation)の併用が、熱ショック応答経路を活性化し代謝異常疾患のインスリン抵抗性、高血糖、慢性炎症、内臓脂肪過多などを改善することを報告してきました。今回新たに、NAFLD バイオマーカー改善効果が認められたこと

により、幅広い代謝異常疾患に対する HS+MES による物理的治療法が選択肢として考えられることとなり実臨床での応用が期待されます。

なお本研究は、欧州科学誌「Endocrine Connections」に令和3年5月1日午前10時（英国標準時）付で掲載されました（日本時間5月1日午後6時）。本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金の支援を受けて実施したものです。

（説明）

[背景]

NAFLD の発症と密接に関連する肥満や 2 型糖尿病は、世界的に蔓延し増加の一途を辿り、重要な医療問題になっています。NAFLD は、単純な脂肪肝の状態から、炎症が悪化した状態の非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）まで幅広い障害を網羅しています。脂肪肝は、NASH を経て進行性の肝線維化から肝硬変、そして最終的には肝細胞癌発症に至ることもあります。

NAFLD は、メタボリックシンドロームや 2 型糖尿病などの代謝異常疾患における重要な病態の一つと見なされており、これらの代謝障害は、インスリン抵抗性と密接に関連しています。最近の研究では、脂肪肝が内臓脂肪の蓄積よりもインスリン抵抗性と密接に関連していることが示唆されており、NAFLD を標的とすることは、インスリン抵抗性を改善する可能性があり、逆もまた同様であると考えられます。

[研究の内容]

NAFLD 脂肪変性マーカーとして、Fatty liver index (FLI)、NAFLD-liver fat score (NAFLD-LFS)、Liver/spleen (L/S) attenuation ratio、Hepatic steatosis index (HSI)、Visceral adiposity index (VAI)、TG×fasting glucose (TyG) index を、NAFLD 線維化マーカーとして Aspartate aminotransferase (AST)/alanine aminotransferase (ALT) ratio、Fibrosis-4 (FIB4) index、NAFLD-fibrosis score (NFS)、AST-to-platelet ratio index (APRI)を用い、HS+MES 治療の前後でどのように変動したかを、過去の被験者データをもとに後ろ向きに検討しました。

[成果]

健常人10名対象の研究では、これらのマーカーに変化は認めませんでした(図1および2)。メタボリックシンドローム40名対象の研究では、VAIとTyGを除く5つのNAFLD脂肪変性マーカーが改善していました(図1および2)。また2型糖尿病100名対象の研究では、すべてのNAFLD脂肪変性マーカーとAPRIを除くNAFLD線維化マーカーが改善しました(図1および2)。またこれらの改善度には、HS+MES治療の頻度と期間をかけ合わせた蓄積暴露時間に相関関係が認められました(図3)。

[展開]

いくつかの2型糖尿病治療薬が、NAFLD治療に有効である可能性が報告されていますが、実臨床においてNAFLD治療適応を持つ薬剤は存在していません。本治療法は、経口薬や注射による薬物療法と異なり、生体が本来持っているストレス抵抗能力を、外的な温熱と微弱電流刺激により物理的に活性化する

新規治療法です。メタボリックシンドロームや2型糖尿病患者における耐糖能、インスリン抵抗性、慢性炎症あるいは合併症に対する有効性も過去に報告しており (EBio Medicine 2014, Scientific Reports 2016) 、新たにNAFLD治療法としての可能性が示されたことから、HS+MES治療は幅広い代謝異常に対して適応拡大できる可能性が期待されます。

[用語解説]

※1 非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD)

アルコール過剰摂取によるものではない、肝臓への脂肪蓄積を病態とする疾患の総称。単純な脂肪肝から、炎症が悪化した非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH) まで幅広い病態を含む。さらに進行すれば肝線維化を伴う肝硬変、そして最終的には肝細胞癌発症に至ることもある。

※2 2型糖尿病

インスリン作用の相対的不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群。インスリン抵抗性、インスリン分泌不全、慢性炎症、小胞体ストレス、酸化ストレスなど種々の病態が複雑に組み合わさっている。長期的な慢性高血糖は、糖尿病特有の細小血管合併症 (網膜症、腎症、神経障害) を引き起こすとともに、全身の動脈硬化症が促進され心筋梗塞、脳梗塞、下肢閉塞性動脈硬化症などの原因となる。

※3 熱ショック応答経路

外的な温熱刺激に対して、熱ショックタンパク質を産生し、生体防御を担う基本的なストレス抵抗性獲得応答経路。種々の生物において進化的に保存されており、特に HSP72 タンパクの産生を介して異常タンパクの修復やストレス応答反応活性化、抗炎症作用、抗糖尿病作用などを発揮する。

(論文情報)

論文名 : Activation of heat shock response improves biomarkers of NAFLD in patients with metabolic diseases.

(和訳) 熱ショック応答経路の活性化は代謝異常疾患に付随する非アルコール性脂肪性肝疾患のバイオマーカーを改善する。

著者 : Tatsuya Kondo , Nobukazu Miyakawa , Sayaka Kitano , Takuro Watanabe , Rieko Goto , Mary Ann Suico , Miki Sato , Yuki Takaki , Masaji Sakaguchi , Motoyuki Igata , Junji Kawashima , Hiroyuki Motoshima , Takeshi Matsumura , Hirofumi Kai , Eiichi Araki

掲載誌 : Endocrine Connections

doi : 10.1530/EC-21-0084 (欧州内分泌学会誌)

URL : <https://ec.bioscientifica.com/view/journals/ec/aop/ec-21-0084/ec-21-0084.xml>

【お問い合わせ先】

熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

担当：近藤龍也（講師）

電話：096-373-5169

e-mail：t-kondo@gpo.kumamoto-u.ac.jp




図 1 NAFLD 脂肪変性マーカーの変化

健常人（左：Healthy male）においては NAFLD 脂肪変性マーカーの有意な変化は認めなかった。メタボリックシンドローム該当者（中：Metabolic syndrome）においては、FLI、NAFLD-LFS、L/S 比、HSI が改善し、2 型糖尿病患者（右：Type 2 diabetes）では加えて VAI、TyG の改善も認められた。




図2 NAFLD線維化マーカーの変化

健常人においてはNAFLD線維化マーカーの有意な変化は認めなかった。メタボリックシンドローム該当者においてはAST/ALT比が改善し、2型糖尿病患者では加えてFIB4およびNAFLD-FSの改善が認められた。




図3 累積暴露時間と各種マーカー改善効果の関連性

HSI、TyG、FIB4、NAFLD-FSおよびAPRIにおいて累積暴露時間が延長するほど、それらのマーカーの改善度が高まる相関性が認められた。